



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

## ÉDITION GRANDES CULTURES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Rue Saint-Jean • B.P. 19 • 31131 BALMA CEDEX  
Tél. Standard : 61.24.70.70 - Technique : 61.24.70.33  
Abonnements : 61.24.70.30

Régisseur de Recettes  
D.R.A.F. "MIDI-PYRENEES"  
CCP : 8618-62 Y Toulouse  
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PERIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL 200 F.

BULLETIN N° 8 DU 15 MAI 1992

## CEREALES

### Stades végétatifs

#### Blé tendre

De gonflement (parcelles d'altitude) à pleine épiaison.

#### Blé dur

Stades 9 à 10, gonflement.

#### Orge d'hiver

Fin épiaison à floraison en cours.

## BLE

### MALADIES DU FEUILLAGE

#### Situation

Faible évolution depuis l'envoi de notre dernier Bulletin (N° 7 du 30/04/92).

- **Oïdium** : localisé aux parcelles déjà attaquées et plus généralement observé dans l'immédiat, sur les feuilles de la base.
- **Septoriose** : elle a légèrement progressé ; est parfois observée sur F3 dans les parcelles les plus favorables (semis précoce en boubènes battantes) et non protégées.
- **Rouille brune** : elle est peu fréquente.  
Observée sur le feuillage de la base (F4, F5) en général, très exceptionnellement sur feuilles supérieures, sur les variétés THESEE et RECITAL, plus rarement sur SOISSONS, semées fin Octobre-début Novembre.  
Evolution dangereuse possible localement, à partir de la pleine épiaison pour des semis de THESEE antérieurs au 5 novembre, à partir de la floraison dans les autres cas favorables.

#### Préconisation

##### • Parcelles traitées

- \* Selon nos conseils du Bulletin N° 6 du 09/04/92, au stade 2 noeuds (potentiel supérieur à 60 quintaux en sols limoneux battants)

*Renouveler le traitement à la pleine épiaison ; choisir un produit à longue persistance d'action sur rouille brune.*

- \* Suite à l'envoi de notre dernier Bulletin du 30/04/92, soit au stade gonflement

*Il est inutile de renouveler l'application qui devrait être suffisante cette année.*

##### • Parcelles non traitées

*Une intervention n'est à envisager que dans les parcelles à potentiel d'au moins 50 quintaux/ha, dans les cas de sols limoneux battants (risque septoriose), ou de semis précoces (20 octobre - 10 novembre) de variétés sensibles à la rouille brune.*